




CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
FRANCHE-COMTÉ 
OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DES INVERTÉBRÉS

PHOTO-GUIDE DE RECONNAISSANCE DES COQUELICOTS ET PAVOTS

Bassin Rhône-Saône-Jura



VÉGÉTAL
local



INDEX

Coquelicots et pavots

Coquelicot commun - <i>Papaver rhoeas</i>	3
Pavot douteux - <i>Papaver dubium</i>	4
Coquelicot argémone - <i>Roemeria argemone</i>	5
Coquelicot hispide - <i>Roemeria hispida</i>	6
Pavot somnifère - <i>Papaver somniferum</i>	7

Illustrations et photographies :

Christophe HENNEQUIN et Pascal COLLIN (*Roemeria argemone*)

Référence bibliographique :

Hennequin C., 2025. *Photo-guide de reconnaissance des coquelicots et pavots*. Bassin Rhône-Saône-Jura. Conservatoire botanique national de Franche-Comté Observatoire régional des Invertébrés. 8 p.

CLÉ DE DÉTERMINATION DES COQUELICOTS ET PAVOTS

1. Feuilles supérieures pennatifides, embrassantes, tiges et feuilles de couleur glauque, glabres, fleurs roses ou blanches. ***Papaver somniferum***

1'. Feuilles non embrassantes, pennatiséquées ou pennatiséquées, vertes, hérissées de poils. Fleurs rouges ou oranges. 2

2. Ovaires et capsules hérissés de soies raides. 3

2'. Ovaires et capsules sans soies raides. 4



3. Capsule globuleuse ou obovoïde. Pétales rouge pourpre. ***Roemeria hispida (= Papaver hybridum)***

3'. Capsule allongée, obovale. Pétales rouge vif, avec une tache noire à la base. ***Roemeria argemone (= Papaver argemone)***




4. Capsule globuleuse ou obovoïde. Nombre de stigmates entre 8 et 14. Pédicelles à poils étalés au sommet. Feuilles largement pennatiséquées. ***Papaver rhoeas***

4'. Capsules allongées. Nombre de stigmates entre 5 et 8. Pédicelles à poils appliqués au sommet. Feuilles étroitement pennatiséquées. 5

5. Latex blanc à la coupure (jonction pédicelle / fleur), capsule régulièrement rétrécie. Pédicelle à poils appliqués. ***Papaver dubium***

5'. Latex jaunâtre à la coupure (jonction pédicelle / fleur), capsule à base arrondie. Pédicelle à poils étalés. ***Papaver lecoqii***

COQUELICOT COMMUN





Papaver rhoeas

Coquelicot commun

Habitats : Cultures, friches, décombres

Dates de floraison : mai-septembre



Papaver dubium

Pavot douteux

Habitats : Cultures, friches, pelouses sèches
Dates de floraison : mai-juillet



Roemeria argemone

Coquelicot argémone

Habitats : Friches, gares, décombres
Dates de floraison : avril-juin



Port général de la plante. Feuille étroitement pennatifidée. Fleur à 4 pétales orangés écartés



Fleurs en bouton



Port de la plante en fruit



Capsule allongée couverte de soies.
Disque stigmatique à 4/6 stigmates


Roemeria hispida

Coquelicot hispide

Habitats : Friches, jachères, décombres
Dates de floraison : mai-juin
Très rare, occasionnel



Port général de la plante. Feuille étroitement pennatifidie



Fleur à 4 pétales pourpres. Étamines à anthère bleue





Capsule globuleuse couverte de soies. Disque stigmatique à 7/9 stigmates

Papaver somniferum

Pavot somnifère

Habitats : Friches, chemins, décombres
Dates de floraison : mai-juillet
Cultivé



LEXIQUE

Anthère : partie supérieure d'une étamine contenant le pollen.

Appliqué : se dit d'un organe, un poil qui forme un angle très aigu ou sont parallèles à la surface qui les porte (ant. : étalé).

Capsule : fruit sec et déhiscent (qui s'ouvre), contenant plusieurs graines. On décrit des capsules loculicides (qui s'ouvre par des fentes), septicides (qui s'ouvre au niveau des sutures des carpelles), poricides (qui s'ouvre par des petits pores) ou transversale (qui s'ouvre par une découpe circulaire, comme une boîte, cas des pyxides, fruits du mouron ou de la jusquiame).

Disque stigmatique : réceptacle élargi au sommet de l'ovaire portant les stigmates rayonnants.

Embrassant : feuille sessile dont la base entoure partiellement ou entièrement la tige.

Étalé : se dit d'un organe, d'un poil faisant un angle de 90° avec la surface qui le porte (ant. Appliqué, apprimé).

Globuleux : sphérique, de forme arrondie.

Obovale : ovale, mais avec la plus grande largeur vers le sommet (comme un œuf à l'envers).

Obovoïde : qui se rapproche de la forme d'un œuf à l'envers.

Pennatifide : feuille dont le limbe est penné et découpé jusque vers le milieu de chaque moitié de limbe.

Pennatipartite : feuille dont le limbe est penné et découpé entre le milieu de chaque moitié de limbe et la nervure principale.

Pétiole : axe de la feuille reliant le limbe à la tige.

Stigmate : extrémité du style ou du pistil plus ou moins visqueux ou plumeux, qui retient le pollen.



CONTACT

9 rue Jacquard
BP 61738
25043 Besançon Cedex
03.81.83.03.58

SUIVEZ-NOUS



www.cbnfc-ori.org

AVEC LE
SOUTIEN DE

