Plantes vasculaires du Jura suisse - Révision 2004 Gefässpflanzen des Schweizer Juras -Aktualisierung 2004

par Philippe Druart, éds.

Ph. Druart, Laboratoire de botanique évolutive, rue Émile Argand 11, CH-2000 Neuchâtel Courriel : philippe.druart@unine.ch

Résumé – La révision de la liste des plantes vasculaires du Jura suisse se poursuit, complétant les mises à jour réalisées précédemment (DRUART *et al.* 2003, 2004).

Ont été retenus 262 taxons dont 259 concernent le Jura suisse biogéographique tel qu'il a été défini en 2001 par le Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF) et le Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF). Selon DRUART et al. (2003), 7 taxons sont considérés disparus [RE], 17 taxons sont au bord de l'extinction [CR], 23 taxons sont en danger [EN], 10 sont vulnérables [VU] et 20 sont potentiellement menacés [NT]. Parmi les 88 taxons nouvellement signalés dans la dition, 21 sont des hybrides, 21 sont des taxons de rang mineur et 37 sont subspontanés, adventices ou naturalisés; 60 sont extraits de la littérature.

Les observations particulièrement intéressantes sont : *Artemisia campestris*, *Centaurea stoebe*, *Puccinellia distans* et *Veronica austriaca* en VD; *Centaurea decipiens s.s.*, *Teucrium scordium* et *Bromus grossus* en NE; *Dryopteris expansa* en NE et BE; *Athyrium distensifolium* en JU et *Sedum villosum* (XVIII^e siècle) en JU.

Les botanistes intéressés par la mise à jour de leur flore cantonale voudront bien envoyer leurs données aux différents auteurs ou aux responsables cantonaux cités en 2003.

Zusammenfassung – Die Revision der Liste der Gefässpflanzen aus dem Schweizer Jura wird weitergeführt, dies in Ergänzung zur jüngsten Publikation Druart *et al.* 2003, 2004). Die Revision umfasst 262 taxonomische Einheiten, von welchen 259 den Jura betreffen, so wie er 2001 vom Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF) und vom Schweizerischen Zentrum für die Kartierung der Fauna (SZKF) definiert worden ist. Nach Druart *et al.* (2003) galten 7 taxonomische Einheiten als ausgestorben [RE], 21 als vom Aussterben bedroht [CR], 28 als stark gefährdet [EN], 14 als verletzlich [VU] und 20 als potenziell gefährdet [NT]. Unter den 88 neu in unserer Publikation aufgeführten taxonomischen Einheiten sind 21 Bastarde, 21 Kleinarten, 37 subspontan, adventiv oder eingebürgert; und 60 Literaturangaben.

Besonders interessant sind die Beobachtungen von Artemisia campestris, Centaurea stoebe, Puccinellia distans und Veronica austriaca im VD; Centaurea decipiens s.s., Teucrium scordium et Bromus grossus im NE; Dryoperis expansa im NE und BE; Athyrium distensifolium im JU; Sedum villosum (XVIIIe siècle) im JU.

Die an einer Aktualisierung ihrer Kantonalflora interessierten Pflanzenfreunde und Botaniker sind gebeten, ihre Beiträge einem der Autoren oder dem 2003 genannten zuständigen Kantonalverantwortlichen zu melden.

Mots-clés : Ajoie, Berne, Biodiversité, Flore, Jura, Neuchâtel, Phanérogames, Ptéridophytes, Soleure, Suisse, Vaud, Vulnérabilité.

Schlüsselwörter: Ajoie, Bern, Biodiversität, Gefährdung, Genf, Jura, Neuenburg, Phanerogamen, Pteridophyten, Schweiz, Solothurn, Waadt.

Keys words: Ajoie, Bern, Biodiversity, Flora, Jura, Neuchâtel, Phanerogame, Pteridophyte, Solothurn, Switzerland, Vaud, Vulnerability.

Introduction

Sont retenus dans ces notes les taxons nouvellement cités pour le Jura biogéographique dans un des cantons, à partir de DRUART et al. (2003), les stations nouvelles ou retrouvées des espèces notées RE, CR et EN dans DRUART et al. (2003) et les stations nouvelles ou retrouvées des taxons très rares (statut équi-

valent à CR) dans un canton donné. Quelques notules sont publiées conjointement dans Druart et Duckert-Henriod (2005).

Limites de la dition

Les limites biogéographiques retenues pour la dition sont celles fixées par le Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF) et le Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) en 2001 (GONSETH et al. 2001), (cf. DRUART et al., 2003). Les plantes présentes à proximité du Jura, sur le plateau ou en France, sont notées « hors dition ».

Les secteurs controversés, comme Lägeren (ZH AG) et La Sarraz (VD), sont inventoriés et répertoriés séparément, de façon à ce que l'on puisse

à volonté les intégrer ou non au Jura biogéographique. Dans cette révision, nous avons également décidé de continuer d'inclure toute l'Ajoie au Jura biogéographique, bien que déjà Bourquin (1932) soulignât la proximité géologique et botanique de la région de Bonfol avec le Sundgau et l'Alsace. La frontière du Jura biogéographique dans le canton du Jura et le Jura suisse fera l'objet d'une étude à venir.

Présentation

La nomenclature suit principalement l'index synonymique d'Aeschimann et HEITZ (1996), dont la nouvelle version est en cours d'édition. À défaut, les binômes proviennent de l'index synonymique français de Kerguélen et Воск (version informatique, 2001) ou du «Zander» (ERHARDT et al., 2000). Les noms des hybrides proviennent de diverses flores. Quelques synonymes sont parfois indiqués pour aider le lecteur à se retrouver dans les méandres de la nomenclature.

Selon les nouveaux critères de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) retenus dans Druart et al. (2003), parmi les taxons observés récemment dans le Jura suisse (143) dans les notules présentées ci-dessous, 7 sont considérés disparus [RE], soit 5%, 21 sont au bord de l'extinction [CR], soit 14,7%, 28 sont en danger de disparition [EN] soit 19,6%, 14 sont vulnérables [VU], soit 9,8 %, 21 sont potentiellement menacés [NT], soit 14,7% et 25 ne sont pas menacés [LC], soit 17,5%. Sont nouvellement cités pour la dition, 88 taxons, soit 32 %. Ces derniers, de même que les taxons notés VU, NT et surtout LC, sont pour la plupart des taxons de rang mineur, des hybrides ou des plantes naturalisées, adventices, subspontanées ou introduites.

De nombreuses localités sont extraites de la littérature, essentiellement de Bourouin (1932), dont le méticuleux travail d'inventaire floristique de l'Ajoie et sa région a été dépouillé. Elles font l'objet d'une présentation

séparée, pour les taxons non cités par ailleurs dans les notules ci-dessous.

Liste des contributeurs du présent article

Alain Perrenoud ArB: Arnaud Brahier Aurèle Graber † Aurélien Labhart Carl Wirth + Charles-Henri Godet † Christian Monnerat Christophe Bornand Claude Favarger Colette Grémaud Coline Druart Daniel Weber

D.-H.: Marie-Marguerite Duckert-

EC: Étienne Chavanne Emiliano Medici Éric Grossenbacher Fabienne Montandon Franco Ciardo Françoise Hoffer-Massard

Friche-Joset † Georges-André Haldimann

Georges Kurz Gregor Kozlowski HC: Henri Ceppi **Jacques Bovet** Jean-Claude Vadam **Jean-Francois Prost**

Jean-François de Chaillet †

Jules Bourquin † Jules Favre † Jules Lerch † Jürg Röthlisberger

Jean Pulver †

Léonore lovis

LJ: Laurent Juillerat Luc Scherrer

M. Curie †

Maud Thievent Michel Desfayes

Nicola Schoenenberger

Patrice Prunier

PhD: Philippe Druart

Philippe Küpfer PhJ: Philippe Juillerat

Pierre Mingard Raymond Delarze

René Jaccard Robert Paroz †

RG: Roger Giamberini

Yorick Ferrez

Abréviations et sigles -**Stichwortliste**

Acc.: accidentel

(Adv.): adventice - adventiv AG: canton d'Argovie - Kanton Aargau

aggl.: agglomération -Agglomeration

BE: canton de Berne - Kanton Bern

ch.: chemin - Weg **CH**: Suisse - Schweiz

[CR]: Critically endangered = gravement menacé d'extinction vom Aussterben bedroht

cv.: cultivar

CVB: Cercle vaudois de botanique

[DD]: insuffisamment documenté - ungenügende Datengrundlage

det. : déterminé par - bestimmt

[EN] : Endangered = menacé d'extinction - stark gefährdet

F: France - Frankreich

FR: Canton de Fribourg – Kanton Freiburg

(Int.): introduit - eingeführt (in der systematischen Botanik oft auch: eingeschleppt)

JU: canton du Jura - Kanton Jura

L: littérature - Literatur

[LC]: Least concern, non menacé, commun, répandu - nicht gefährdet, häufig, verbreitet

(Nat.): naturalisé - eingebürgert

NE: Canton de Neuchâtel -Kanton Neuenburg

NEU: herbier de l>Institut de botanique de l'université de Neuchâtel - Herbarium des Botanischen Instituts der Universität Neuenburg

[Ni] : plante invasive en Suisse - in der Schweiz invasive

[NT]: Near Threatened, potentiellement menacé - potenziell gefährdet

p.p.: pro parte = pour partie zum Teil

qq.: quelques - einige

RE: disparu régionalement – regional ausgestorben

SH: canton de Schaffhouse -Kanton Schaffhausen

- **SO** : canton de Soleure Kanton Solothurn
- st. : station, au sens géographique de localisation - Standort
- (Sub.) : subspontané subspontan **VD** : canton de Vaud - Kanton Waadt
- [VU] : vulnérable verletzlichVF : voie ferrée BahnlinieZH : canton de Zurich KantonZürich
- *: taxon nouveau pour un secteur de l'Atlas (Welten & Sutter, 1982) ou la partie jurassienne d'un canton d'après Druart et al. (2003) neue taxonomische Einheit für eine Kartierfläche im Verbreitungsatlas (Welten & Sutter, 1982) oder für den Jurabereich eines Kantons im Sinne von Druart et al. (2003)
- : taxon nouveau pour la partie jurassienne d'un canton – neue taxonomische Einheit für den Jurabereich eines Kantons
- **: espèce nouvellement signalée dans le Jura suisse biogéographique pour Druart et al. (2003) – neu angegebene Art für den Schweizer Jura im biogeographischen Sinn nach Druart et al. (2003)
- espèce nouvellement signalée dans le Jura suisse biogéographique (à notre connaissance)
 neu angegebene Art für den Schweizer Jura im biogeographischen Sinn
- selon le contexte : en amont, au-dessus, plus de – je nach Zusammenhang: aufwärts, oberhalb, mehr als
- < : selon le contexte : en aval, au-dessous – je nach Zusammenhang: abwärts, unterhalb
- †: Taxon absent de Aeschimann & Heitz (1996) – taxonomische Einheit fehlt in Aeschimann & Heitz (1996)

Notules - Einzelangaben

Les notules se présentent ainsi : Binôme latin, [n° in Flora Helvetica (LAUBER et WAGNER, 2000)], [statut UICN in DRUART et al., 2003], canton, (statut Adv., Sub., etc.), secteur de l'Atlas (Welten et Sutter, 1982), commune(s), localité(s), population, date (auteur, année).

Die Einzelangaben sind wie folgt gegliedert:

wissenschaftlicher Name, [Nummer in Flora Helvetica (Lauber et Wagner, 2000)], [Status UICN nach Druart et al. (2003)], **Kanton**, {eventuell Grad der Einbürgerung}, Kartierfläche im Verbreitungsatlas (Welten et Sutter, 1982), Gemeinde, Ortsbezeichnung, Populationsgrösse, Datum (Autor, lahr).

- Adenocarpus complicatus (L.) Gay s.s. L •• JU• Ajoie et Jura suisse (Pottier-Alapetite, 1943); non signalé ailleurs en Suisse à notre connaissance et considéré comme éteint; non signalé en Ajoie par Bourquin (1932); à confirmer. Espèce sub-atlantique de l'W et du centre de la France qui atteint sa limite occidentale sur le versant W du Jura; observé encore en Franche-Comté dans le massif de la Serre en 1986 par J.-F. Prost (Ferrez, Prost et al., 2001); a été revu dernièrement par la Société Mycologique Doloise (André, comm. pers.)
- ◆ Alopecurus rendlei Eig [2786] L
 •• JU• (Adv. Acc.) 147* ou 148*
 Boncourt: le 28-06-1924; autrefois très commun dans le pays de Montbéliard vers 1850 d'après Contejean (1854), presque disparu en 1892 (Bourquin, 1932); plus signalé depuis. Indiqué par Aïno Adriaens à Mouthe récement (Ferrez, comm. pers.).
- Althaea hirsuta L. [509] [EN] NE 133 Le Landeron: Les Joumes, déjà récolté par C. Favarger en 1965 et observé par R. Paroz en 1977 (Paroz et Duckert-Henriod, 1998), garide < route de Lignères, 590-600 m, > 30 pieds (PhD! 2001-2004), (Druart et Duckert-Henriod, 2004). Hors dition VD Montcherand: Pré du Moulin, de part et d'autre de la route > usine électrique, 500 m, > 30 pieds en fleur le 12-06-2004 (! HC); les communes de Montcherand et de

- Sergey ont une géologie et une position géographique qui justifient sans aucun doute leur appartenance au domaine floristique du Jura (CEPPI, comm. pers.)
- Althaea officinalis L. [510] [RE] JU* (Sub.) 161* Grandval : Les Préaies, 625 m, 1 pied (EC! 2002-2003). L JU• (Sub.) Pl. médicinale subspontanée à Porrentruy : Voyeboeuf Saint-Ursanne : scierie de Lorette (Bourquin, 1932).
- Alyssum alyssoides (L.) L. [685] [VU] VD 103 Bière: place d'armes, Champage/Chante-Merle/La Billarde, Xerobromion, disséminé à plusieurs places, 690-810 m, > 100 pieds (! PhD et LJ); considéré disparu du Jura vaudois (DRUART et al., 2003); en régression dans le Jura suisse: considéré disparu du Jura neuchâtelois où il était signalé comme bien présent il y a encore quelques décennies dans les secteurs 125, 132, 134 et 137 (WELTEN et SUTTER, 1982).
- Amaranthus bouchonii Thell. [443] [EN] JU (Adv.) 164* Delémont : La Ballastière, 415 m, < 10 pieds (EC ! 2004). 165* Courrendlin : Vers la Vieille Eglise, 425 m, < 10 pieds le 31-08-2004 (! EC) Courroux : Bellevie, 435 m, < 10 pieds le 31-08-2004 (! EC).</p>
- *Amaranthus hybridus* L. *s.s.* var. erythrostachys Moq. [444] ** **NE•** 121* (Sub.?) Couvet : gare TRN S-E, ballast, 735 m, 1 pied en fruit le 5-11-1999 (! PhD), plante entièrement pourpre. JU• 164* Delémont : La Ballastière, 415 m, 1 pied (EC! 2004). L •• SO • (Sub.) 1 st. (Brodtbeck et al., 1997). Amaranthus est un genre complexe dont le rang spécifique des taxons adventices présents dans nos régions est traité différement selon les auteurs; d'où une nomenclature embrouillée. Nous suivons ici Lambinon et al. (2004). Ce taxon correspond à Amaranthus cruentus L. s.s. (Lauber et Wagner, 2000) et est inclus dans Amaranthus cruentus L. aggr. in (AESCHIMANN et BURDET, 1994).

- Antirrhinum majus L. [1753] [NT]
 BE (Sub.) 151 La Neuveville : gare
 CFF, 435 m, 1 pied le 4-07-2004
 (! PhJ).
- Arabis rosea DC. [681] [VU] Hors dition VD (Nat.) 225* Orbe: mur ombragé, 480 m, > 20 pieds (F. Hoffer-Massard! 2003-2005), (BORNAND et HOFFER-MASSARD, 2004, et comm. pers.); originaire d'Italie méridionale.
- Artemisia campestris L. [2147]
 [CR] VD 103* Bière: place d'armes, coteau de Chante-Merle, 710-800 m, > 500 pieds (PhD! 2004).
 NE 133 (Adv.) Neuchâtel: gare CFF N-E, < pont du Mail, 480 m, 1 pied (PhD! 1999).
- **Asplenium trichomanes** L. subsp. hastatum (H. Christ) S.Jess. VD* 107* Le Lieu : lac de Joux/Le Revers, 1005 m, > 5 pieds le 10-09-2003 (! PhD), (DRUART, 2004). **BE•** 151* 154* Bienne: gorges du Tubeloch et >, balmes et falaises, 460-570 m, > 20 pieds (PhD ! 2003-2005). JU• 147 Courchavon: N village, balme, 410 m, > 10 pieds, le 16-04-2004 (! PhD). **L VD•** 101* 102* 112* 114* 116* 123* Arzier/Bassins: gorges de Moinsel, 810 m; Vallorbe: gorges de l'Orbe, 640 m; Baulmes: Sur Trois Villes, 980 m; Sainte-Croix: gorge de Covatanne, 600-780 m, 2003 (MINGARD, 2004). Répandu, souvent sous les falaises calcaires surplombantes; statut UICN proposé pour le Jura suisse [NT].
- Athyrium distentifolium Opiz [56] [VU] JU • 143* La Chauxdes-Breuleux : au nord de l'étang de la Chaux, 985 m, < 10 pieds (EC! 2004).
- Avena barbata Link s.s.
 NE
 (Adv.) 132* Boudry: gare CFF, 490 m, 1 pied le 16-05-2004 (!PhD).
- Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
 [886] NE 133 (Nat.) Neuchâtel:
 rue Matile 2, 537 m (D. Weber!

- 1970-2003), (Druart et Duckert-Henriod, 2004).
- Bromus carinatus Hook. et Arn. • VD • (Adv. Nat.) 101* St-Cergue: gare de la Cure, 1150 m, 1 pied, le 29-08-2004 (! F. Hoffer-Massard). 103* Mollens : vers 750 m, > 20pieds (F. Bornand! 2004). 111* Croy: 650 m, > 50 pieds le7.11.2004 (! F. Hoffer-Massard). NE• 134* (Nat.) Valangin: Bussy, route et chemins alentour, 700-750 m, > 200 pieds (PhD! 2003-2005), (Druart et Duckert-HENRIOD, 2004). 213* Bassins: vers 600 m, > 50 pieds le 28-08-2004 (! F. Hoffer-Massard). L Hors dition VD (Adv.) 225* Orbe: La Reusille, F. Hoffer-Massard, 2003, (! F. Hoffer-Massard), (BORNAND et Hoffer-Massard, 2004, et com. pers.).
- Bromus grossus Desf. ex DC. [2610] [CR] NE 133 (Adv.? Int.?) Hauterive: Laténium/musée d'archéologie, 435 m, > 10 pieds (PhD! 2004-2005), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).
- Bupleurum lancifolium Hornem. L •• **JU**• (Adv.) 148* (= *B. protrac*tum Hoffmgg. et Link.) Porrentruy: dès 1928; Charmoille: leg. F. Fridelance, det. H. Jenny, 1930 (Bourquin, 1932). Selon les auteurs B. lancifolium et B. protractum Link et Hoffmanns. (= B. subovatum Link. ex Sprengel) sont considérés comme une même espèce ou séparés. La tendance actuelle, selon Kerguelen et Bock (2001), est de les distinguer. Il faudrait donc réviser le matériel d'herbier disponible et attribuer les plantes jurassiennes à l'une ou l'autre espèce.
- Butomus umbellatus L. [2383] [CR] JU (Int.) 146* Courgenay: étang de la Creule, 455 m, 3 pieds (EC! 2002). L Hors dition Doubs Signalé à Bourogne et dans la vallée de la Bourbeuse par Contejean (BOURQUIN, 1932).
- Calamintha ascendens Jord. [1691]
 [EN] NE• (Adv.) 133* Neuchâtel :

- rue Emer-de-Vattel, 560 m (D.-H.! 2003), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004). **JU*** 166* Soyhières: Derrière la Vieille Église, 500 m, < 10 pieds (EC! 2002).
- Calendula officinalis L. [2190] JU* 139 (Sub.) Les Bois : Biaufond, rive du lac du Refrain, 605 m, 1 pied en fleur le 27-10-2004 (! PhD). L JU (Sub.) Ajoie : très souvent subspontané dans les lieux vagues (Bourquin, 1932).
- Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.
 [1565] [LC] BE (Sub.) 158*
 Tavannes: village, 750 m (EC! 2003).
- Capsella rubella Reut. [712] [EN] NE 132 Vaumarcus : observé à 450 m depuis A. Graber (1925), pied S Château, 460 m, > 200 pieds le 22-04-2004 (! J.-C. Vadam, PhD, P. Mingard et J. Bovet); Bois des Portes/Champ Plat, 560 m, > 5 pieds; Champ de l'Escarpé, cabane forestière, 590 m, > 10 pieds, W Redoute des Bourguignons, 610 m, > 100 pieds - (Adv.) Boudry: Chambrelien, route de Boudry, ferme, 620 m, 2 pieds. 134* (Adv.) Valangin: La Borcarderie W, lisière bois, 680 m, 1 pied (PhD! 2004); p.p. (DRUART et Duckert-Henriod, 2004).
- Capsella x gracilis Gren. = Capsella rubella x bursa-pastoris ** NE* 132* Vaumarcus: Bois des Portes/Champ Plat, 560 m, > 5 pieds en fleur et fruit le 2-05-2004 (PhD! 2004) Gorgier: Chez le Bart, W port, 428 m, > 5 pieds en fleur et fruit le 10.04.2005. L ●● NE● 133* Neuchâtel: chemin de l'Orée, 530 m (C. Favarger! 1958), (PAROZ et DUCKERT-HENRIOD, 1998).
- Carex dioica L. [2510] [EN] VD 123 Sainte-Croix : récolté depuis P. Morthier au XIX^e siècle, tourbière de la Vraconnaz, 1 090 m, > 5 places, > 50 pieds en fruit le 8-07-2004 (! PhD, R. Delarze, Y. Ferrez, G. Kozlowski et al.); en forte régression dans le Jura suisse : encore observé en NE

- par C. Favarger au Petit Cachot en 1963 et recherché depuis en vain.
- Carex distans L. [2587] [VU] NE 133* Saint-Blaise: marnière d'Hauterive, 560 m, > 10 pieds (PhD; A. Labhart; LJ! 2004), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004); avec C. hostiana à proximité; non signalé en NE depuis 1955 [rive N du Loclat, herb. C. Favarger].
- Carex grayi Carey •• NE• 133* (Int.?) Hauterive: Laténium/musée d'archéologie, 428 m, > 20 pieds (PhD! 2003-2004), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).
- Carex tomentosa L. [2559] [NT] JU 148 Bonfol: Chéchion, 440 m, le 26-04-1998 (! Ch. Monnerat et ArB); indiqué comme éteint (DRUART et al., 2003).
- Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. s.s. [2726] [EN] VD 103* (Nat.) Bière: place d'armes au Crêt des Fourches, dépressions ± humides, 680 m, > 100 pieds (PhD! 2004); Eragrostion. NE 132 Vaumarcus: terrain vague au S de la gare, entre maison et VF, 440 m, > 20 pieds le 20-06-2004 (! HC). 252 Cornaux: gare de triage, 440 m, > 10 pieds (PhD! 1999). L JU (Adv.) 148* Porrentruy: gare, 423 m, le 3-05-1912 (BOURQUIN, 1932); puis plus signalé.
- Centaurea decipiens Thuill. s.s. •• **VD•** 103* Bière : place d'armes, Vieux Camp/W Le Vernay/Chante-Merle, La Billarde, coteau, 700-810 m, > 20 pieds, + hybrides avec C. jacea subsp. angustifolia (PhD! 2004). **NE•** 132* Vaumarcus : Vigne de la Vaux, 560 m, > 20 pieds - Boudry : W Les Buchilles et E Perreux, 494-540 m, > 100 pieds. 133* Hauterive: N-W Laténium, 435 m, > 5 pieds - Le Landeron : > route de Lignière, 510 m, 2 pieds. 134* Valangin: La Sauge N-W, route -> Boudevilliers, 700 m, > 20 pieds; Verger d'Hauterive, 650-660 m, > 10 pieds (PhD! 2004). Taxon occidental qui

- ne se trouve pas en Suisse d'après C. Favarger (Paroz et Duckert-Henriod, 1998). Statut UICN proposé pour le Jura suisse [EN].
- Centaurea decipiens Thuill. subsp. ruscinonensis (Boiss.) Dostál [CR] NE 121 Gorgier: Creux du Van, bord route forestière > Ferme Robert, déjà observé par J.-F. Prost en 1985 (PROST, 2000 et comm. pers.), 1000 m, 2 pieds en fleur-fruit le 16-10-2004 (!PhD). Det. d'après [(JOVET, VILMORIN et KERGUELEN, (1985), 6e suppl., p. 734]; ce taxon, observé en 1985 en un seul exemplaire, est bien toujours présent, au même endroit.
- Centaurea stoebe L. [2244] [RE] VD 103* Bière: place d'armes, Vieux Camp/Champage/Crêt des Fourches/Chante-Merle -> La Billarde, plaine et coteau au N, disséminé un peu partout sur 4 km², surtout sur les sols écorchés, dans les Mesobromion et Xerobromion, 670-840 m, > 10000 pieds (PhD et LJ! 2004; det. PhD).
- Centaurea thuillieri J. Duvign. et Lambinon [CR] •• NE• (Adv.?) 132* Boudry: Perreux, W Les Buchilles, 494 m, > 5 pieds en fleur le 23-10-2004. 133* Hauterive: Laténium N-W, pré près de l'autoroute, 435 m, > 5 pieds en fleur le 21-10-2004 (! PhD); det. d'après LAMBINON et al. (2004).
- Cerastium glutinosum Fr. [375] [CR] LJU ● 148* Porrentruy: gare, 425 m, très commun; se propage également par la VF (BOURQUIN, 1932). D'après JAUZEIN (1995, p. 164), ce taxon devrait avoir au plus un rang variétal.
- Cerastium pumilum Curtis [374] [NT] JU (Adv.) 147 Boncourt : gare CFF, 370 m, > 50 pieds en fleur le 16-04-2004 (! PhD); non signalé en JU depuis Bourquin (1932) et considéré disparu (Druart et al., 2003).

- Cerastium semidecandrum L. [373] [NT] JU (Adv.) 145* Glovelier: gare, 510 m, à plusieurs places, > 200 pieds. 147* Boncourt: gare CFF, 370 m, > 20 pieds Courtemaîche: gare CFF, 397 m, > 100 pieds. 148 Porrentruy: gare CFF, 425 m déjà observé, RR, par BOURQUIN (1932), > 100 pieds en fleur et fruit le 16-04-2004 (! PhD). L JU (Adv.) 146* Porrentruy: au Banné et à la Perche! Friche-Joset (THURMANN, 1844).
- Ceratophyllum submersum L. [114] [CR] **VD** 107 Le Lieu : lac Ter, 1017 m, encore observé par Desfayes le 26-08-1992 (comm. pers.); recherché en vain en 2003-2004, indépendamment par M. André et Ph.D.; ces dernières années, le lac Ter n'était plus qu'un « infâme cloaque » où se déversent les eaux usées du village, par l'intermédiaire d'une STEP dont le fonctionnement doit être analysé... Peut-être disparu du Lieu et donc du massif du Jura. L VD RE in Müller (1993). JU. 148* Bonfol: étang inf. = étang Chapuis, avant son assèchement, 1930 (Bourquin, 1932).
- Chenopodium strictum Roth [302] [EN] NE 132* Boudry: Les Planchamps, champ de céréales près des buttes du stand de tir, 600 m, 3 pieds le 11-08-2004 (! HC).
- Cirsium x gerhardtii Schultz-Bip. = Cirsium eriophorum x vulgare ** NE* 138* La Chaux-de-Fonds: Gros Crêt S, carrière et pâturage adjacent, 1250-1270 m, 3 pieds dissiminés en fleur et fruit le 8-09-2004 (! PhD); proche des parents. L •• NE• 125* Les Pontsde-Martel: Bied des Ponts, 1000 m (R. Paroz ! 1980). 137* Les Pontsde-Martel: Combe aux Fontaines, 1100 m (R. Paroz ! 1977), (PAROZ et DUCKERT-HENRIOD, 1998).
- Cirsium x hybridum Koch ex DC.
 Cirsium oleraceum x palustre
 [LC] ** NE* 134* Valangin : Verger d'Hauterive, 680 m, inter parentes, 2 pieds en fleur le 19-06-2004

- (!PhD). L •• NE• 121* Boveresse: environs, 750 m [herb. Chaillet *in* Godet (1853)]. 252* Le Landeron: marais de Saint-Jean, 434 m [Curie *in* Godet (1853)].
- Cotoneaster obtusisepalus
 Gandoger VD 106* Montricher:
 crête de Châtel, 1330 m, 1 pied
 le 9-07-2004 (! PhD et F. Ciardo).
 NE 121* Gorgier: Dos d'Ane,
 1290 m, 1 pied (DRUART et DUCKERTHENRIOD, 2004). 133 Neuchâtel: E
 garide de Pertuis du Sault, 590 m,
 1 pied (PhD! 2004).
- Crataegus x media Bechst. = Crataegus laevigata x monogyna •• NE• 134* Boudevilliers : S La Frasse, 720 m, 1 arbuste, le 4-06-2004 (! PhD). BE• 164* Moutier : Pré Ouchin/Montagne de Moutier, 1065 m, 1 arbuste (leg. Maud Thievent, det. PhD 2004).
- Cuscuta europaea L. [1562] [EN]
 NE 132 Vaumarcus: Vignes de la Vaux, 525-530 m, > 20 m² (PhD! 2004); sur Urtica dioica.
- *Cyperus longus* L. *s.s.* [2467] [EN] **BE** (Int.) 158* Court : Lac Vert, 838 m, > 10 pieds le 10-08-2003 (! PhJ et LJ).
- Digitaria ischaemum (Schreb.)
 Muhl. [2800] [NT] JU 166
 Delémont: rue Chante-clair,
 450 m, > 200 pieds (EC! 2004);
 indiqué comme éteint (DRUART et al., 2003).
- Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy [46] [CR] NE• 121* Gorgier : Creux du Van, à plusieurs places dont vers la Fontaine Froide, 1120-1150 m, > 20 pieds (PhD! 2003-2005). 124* La Brévine : La Cornée W, 1200 m, 6 pieds le 4-09-2003 (!PhD), (Druart et Duckert-Henriod, 2004). **BE** • 153* Villeret: l'Egasse, crête N-E, 1455 m, 3 pieds (PhD! 2004-2005); Chasseral, vire au N du Pré aux Auges, 1270 m, > 5 pieds le 17-06-2005 (! PhD et A. Perrenoud). En **VD** P. Mingard avait indiqué D. expansa comme présent (DRUART et al., 2003), ceci n'est pour l'instant pas confirmé

- [cf. Mingard, 2004)]. L'espèce y est seulement signalée (Herbarium) dans le secteur 104 (La Dôle) par l'Atlas (Welten et Sutter, 1982).
- Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce [48] [NT] ** NE• 138* La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes: Les Saignolis, vers 1250 m, 1 pied le 16-05-1999 et le 4-11-2001 (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2003). L •• JU• 146• Damvant: chaîne du Lomont, 700 m (VADAM, 1990).
- Echinops sphaerocephalus L.
 [2229] [EN] L BE (Nat.) 151*
 Bienne: Côte de Macolin, au bord d'un chemin forestier,
 650 m, 5 pieds (THIÉBAUD, 1953)
 Daucher: garide à l'est de Daucher, observé entre 1961 et 1968 par Krähenbühl (1970).
- *Erigeron annuus* (L.) Desf. *subsp. strigosus* (Muhl. ex Willd.) Wagenitz [2059] [NT] ** NE• (Adv.) 138* Le Locle : déchetterie/décharge des Frêtes, 920 m, > 5 pieds en fleur le 5-10-2004 (! PhD); poils de la tige apprimés et courts; capitule à ligules nettemt + courtes que la largeur du disque (LAMBINON et al., 2004). L •• JU• (Nat.) 146* 147* 148* Porrentruy à Bellevue; Alle; Courgenay, det. Binz (Bourquin, 1932); sous *E. ramosus* (Walter) B.S.P.
- Erophila praecox (Steven) DC. [706] [LC] JU 145* Glovelier: gare, 510 m, > 50 pieds en fleur et fruit 147* Boncourt: gare CFF + VF -> France, 370 m, > 200 pieds en fleur et fruit; + E. verna, CC. 148* Courtemaîche: gare CFF, 397 m, > 20 pieds en fleur et fruit le 16-04-2004 (! PhD).
- Euphorbia maculata L. [1309] [NT] JU • (Nat.) 148* Porrentruy: gare CFF, 430 m, > 500 pieds (PhJ; PhD! 2004).
- Euphorbia nutans Lag. [1314] [(EN)] SO 324 (Adv.) Olten: gare CFF, 400 m, 2 pieds (PhD! 2001); déjà signalé anciennement dans ce secteur (Welten et Sutter, 1982).

- Euphorbia virgata Waldst. et Kit. = Euphorbia tommasiniana Bertol. [1322] [EN] VD• (Adv.) 103* Bière: place d'armes, E La Repentance, 820 m, > 10 pieds en fruit le 3-10-2004 (! PhD). NE 134* Valangin: W La Sauge, sommet coteau -> S stade de football, 730 m, > 100 pieds le 17-09-2004 (! PhD).
- Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (Koch) Arcang. [238]
 [VU] L JU 148* Porrentruy: leg. J. Thurmann (Godet, 1853); gare de Porrentruy, 425 m, 1915 (Bourquin, 1932).
- Galium spurium L. subsp. tene*rum* (Schleich. ex Gaudin) Nyman [1950] [CR] **NE** 121 Gorgier: Creux du Van, balmes de la Rocheaux-Noms, signalé depuis J. Lerch au XIX^e siècle (Spinner, 1918), 1240-1250 m, > 50 pieds de 5-15 cm le 10-06-2004 (! PhD) (DRUART et Duckert-Henriod, 2004). 132* Vaumarcus : vallon de la Vaux, petite balme près du Château, 500 m, 1 pied en fleur et fruit le 12-06-2004; fruit 1,5 mm de haut (! PhD). L JU • 148* Alle, 1924; (Adv.) Gare de Porrentruy, 1926 (Bourquin, 1932); sous G. aparine L. subsp. spurium (L.) Rouy var. vaillantii (DC.) Koch.
- Gentiana campestris var. suecica Froelich NE 122 Gorgier: La Roche Devant, aire de décollage des parapentes, 1370 m, 1 pied en fleur le 8-07-2003 Gorgier/St-Aubin/Montalchez: déjà observé par C. Favarger, Grand Vy, Creux de l'Eau, Soliat, 1350-1440 m, en fleur le 4-07-2004, > 10 pieds disséminés (PhD! 1990-2005), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004); forme précoce fleurissant en juin-juillet.
- Geum x intermedium Ehrh. • NE• 134* Boudevilliers: déjà signalé en NE, dans le Val de Ruz, Godet (1853, 1869), Bois du Clos, 775 m, > 5 pieds en fleur le 4-06-2004, inter parentes (! PhD), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004). L 121• Val de Travers (CHAILLET, 1836).

- **Hors dition BA SO** (Вкортвеск *et al.*, 1998).
- Globularia cordifolia x bisnagarica L • NE• 121* Brot-Dessous : gorges de l'Areuse, usine des Moyats, 570 m, inter parentes, le 29-05-1999 (! HC, F. Hoffer-Massard et al.), (CEPPI et HOFFER-MASSARD, 2000).
- ► Helianthus annuus L. s.s. [2093] [LC] JU* 139* (Sub?) Les Bois : Cul des Prés, 800 m, 1 pied en fleur le 18-08-2003 (! PhD). L JU • (Sub.) Ajoie : souvent subspontané près des habitations; plus rarement dans les moissons (Bourquin, 1932).
- Hemerocallis lilio-asphodelus L. [2836] •• JU• (Sub.) 146* Porrentruy: La Rasse, 440 m, < 10 pieds le 19-09-1996 (! ArB); ch. des Chenevières, dans un jardin abandonné, 445 m, > 10 pieds (EC ! 2002).
- Hieracium aurantiacum L.
 [2352] [NT] JU (Sub.) 147
 Courchavon: village, 407 m,
 1 pied le 25-05-2004 (! PhJ).
- Hieracium flagelliferum Ravaud = Hieracium sabaudum x lachenalii
 ** NE 134* Valangin : La Sauge, haut-talus route -> Boudevilliers, 725 m, 1 pied le 17-09-2004; det. d'après Joyet et VILMORIN (3e suppl. à la Flore de Coste).
- Hieracium pellitum Fr. = Hieracium sylvaticum-tomento-sum ** NE* 121* Gorgier : Creux du Van, déjà observé par J. Pulver (Graber, 1923), pessière à myrtilles < éboulis, 1180 m, 2 pieds (PhD! 2004), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004); à proximité des parents; à sétules des poils bcp moins longues et pilosité moins dense que celles de H. tomento-sum observé juste en amont.</p>
- Hieracium piloselloides Vill.
 [2353] [LC] JU 148 Bonfol: Maitie,
 440 m, > 10 pieds le 19-06-2004
 (! PhJ et LJ) (Adv.?) Porrentruy:
 gare CFF, 425 m, > 5 pieds en

- fleur et fruit le 3-08-2004 (! PhD et PhJ); déjà signalé sur les VF en Ajoie : Bonfol et Vendlincourt (Bourquin, 1932). Était considéré éteint (DRUART et al., 2003).
- Hieracium x zizianum Tausch = Hieracium piloselloides x cymosum [CR] L JU • 148* Sur les sables vosgiens -> Vendlincourt et Porrentruy (Bourquin, 1932) SH • Schaffhouse (Christ, 1883).
- Hypericum humifusum L. [493] [NT] NE 132 Vaumarcus: Redoute des Bourguigons S-W, ourlet, 605 m, > 50 pieds en fleur le 16-06-2004 (! PhD), sur moraine glaciaire, avec Veronica officinalis et Rumex acetosella; non signalé en NE depuis Godet (1853).
- Lactuca saligna L. [2315] [RE]
 NE 133 (Adv.) Cressier: gare
 CFF, 435 m, > 5 pieds (PhD!
 1999), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD,
 2004).
- Lamium galeobdolon (L.) L. s.s. [1664] NE 132 (Nat.) Corcelles: S Les Vernets, bois, lisière S, 630 m, > 30 m² (PhD; LJ! 2004), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).
- Lamium hybridum Vill. [1660] [CR] VD • 116* (Adv.) Bonvillars: Tivoli, vignes à l'W de la route -> Fontanezier, 520 m, 5 pieds en fleur le 14-04-2004 (! HC).
- Leontodon hispidus subsp. danubialis (Jacq.) Simonk. = L. hispidus subsp. hastilis (L.) Gremli [2267] [LC] VD 101* Bassins: entre Mondion et le Crêt de Grison, 1290 m, > 10 pieds le 6-09-2002. 107* Le Lieu: les Esserts-de-Rive, grève du lac de Joux, 1004 m, > 5 pieds le 3-09-2003 (! PhD) (DRUART, 2004). L JU• Ajoie: la var. glabratus (Koch) Bischoff est commune (BOURQUIN, 1932).
- Lepidium neglectum Thell. [750] [CR] JU • (Adv.) 147 Boncourt: gare CFF + VF -> France, 365-370 m, > 10 pieds en fleur et fruit le 3-08-2004 (! PhD et PhJ).

- Linaria x sepium Allman = Linaria repens x vulgaris •• JU• (Nat.) 148* Porrentruy: gare CFF, déjà signalé par Bourquin (1932), revu par Monnerat (1999), 425 m, > 20 pieds en fleur le 3-08-2004 (!PhJ et PhD).
- Linum ockendonii Greuter et Burdet [1345] [EN] NE• 134* Fontaines: Vue-des-Alpes E, crête petite carrière, 1 285 m, 2 touffes (F. Montandon! 2002-2004, sous *Linum alpinum*), idem, ≥ 16 touffes = > 200 tiges (PhD ! 2004); det. petite espèce PhD, confirmation G.-A. Haldimann par comptage chromosomique et observation microscopique (DRUART et Duckert-Henriod, 2004). Il s'agit bien ici du taxon jurassien tétraploïde à 2n = 36 : Linum ockendonii Greuter et Burdet = L. perenne subsp. montanum (DC.) Ockendon; sép. int. 5,7-6,4 mm à l'anthèse, larges; sép. ext. 2 fois plus étroits, ± de même longueur; sép. = aux 3/4 à 5/6 de la capsule mure; tiges dressées; pollen percé de pores (microscope x 200); det. d'après Jovet et Vilmorin (1984, 1er suppl.) et Guinochet et Vilmorin (1975, T. 2).
- Medicago arabica (L.) Huds. [1112] [EN] NE (Nat.) 132* Vaumarcus: Le Moulin, pelouse, 550 m, > 10 pieds le 4-10-2004 (F. Ciardo! 2004). 133 Neuchâtel: Metallor, pelouse, 480 m, > 50 pieds (E. Medici! 2002; PhD! 2002-2005), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2003, 2004); (Adv.) Neuchâtel: pelouse près du port du Nid-du-Crô, 435 m, > 10 pieds (N. Schoenenberger! 2005). Probablement introduit en NE avec des mélanges de graines pour gazon sur terrain sec.
- Medicago x varia T. Martyn = Medicago sativa x falcata [1111] [EN] JU* 164 Delémont : La Ballastière, 415 m, < 10 pieds (EC ! 2003). 165 Courrendlin : Ava-les-Aves, 430 m, < 10 pieds le 10-09-2003 (! EC). L JU 148* Courtemaîche : talus de la VF près de la gare, 400 m, le 22-06-1921;</p>

- sans les parents (Bourquin, 1932).
- Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. tenuifolia (L.) Kerguelen [333] •• VD• (Adv.) 103* Bière: place d'armes, plaine de Champage, 680 m, > 20 pieds en fleur le 28-05-2004 (! PhD). NE• (Adv.) 132* Vaumarcus: port, grève, 429 m, 1 touffe le 17-07-2003 Boudry: E gare CFF, 450 m, > 20 pieds (PhD! 2003-2005), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004, 2005); pl. glabre à 10 étamines; fleurs grandes, pét. > 2 mm, sép. > 3,5 mm; dét. d'après JAUZEIN (1995).
- *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischkin susbp. *laxa* (Jord.) Garraud •• VD• (Nat.) 103* Bière: Champage/Crêt des Fourches, et moins dense, le Verney/Vieux Camp/Chante-Merle, plaine de la place d'armes et coteau, répandu partout dans les zones ± écorchées (Xerobromion / Alysso-Sedion), 670-780 m, > 20000 pieds (PhD)et LJ! 2004; det. PhD). NE* (Adv. Nat.) 132* Vaumarcus: N Redoute des Bourguigons, bord champ de céréales, 605 m, 9 pieds - Bôle : Planeyse, talus sec, 480 m, > 100 pieds (PhD! 2004) - Hauterive/Saint-Blaise: W gare CFF, 450 m, > 20 pieds (PhD et LJ! 2004) - Saint-Blaise: gare de St-Blaise Lac, 435 m, > 100 pieds (PhD ! 2003-2004), (DRUART et Duckert-Henriod, 2004). JU• 147* (Adv. Nat.) Boncourt: VF -> France, 365 m, > 50 pieds (PhD ! 2004). Hors dition GE 201 La Plaine: gare CFF, 356 m, > 200 pieds en fleur et fruit le 22-06-2005 (! PhD). Description: 3-5 étam., poils glanduleux uniquement sur les sép. et rares sur le haut des pédoncules, pét. 1,1-1,3 à 1,5-1,7 mm selon les populations, gr. échinulées sur le dos et les côtés; dét. d'après Jauzein (1995).
- Muscari comosum (L.) Mill. [2889]
 [EN] VD 116 Concise: La Raisse, déjà observé par R. Paroz en 1969, talus VF désaffectée, 450 m, 3 pieds en fleur le 16-05-2004

- (!HC). **NE** 133 Saint-Blaise: marnière d'Hauterive, 560 m, 1 pied (A. Labhart; PhD! 2004), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).
- Myosotis stricta Link ex. Roem. et Schult. [1592] [CR] NE 121* Gorgier: Creux du Van, Roche aux Noms S, 1255-1265 m, > 200 pieds (PhD! 2003-2005), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, (2004). L JU Myosotis micrantha Pallas est indiqué dans l'Énumération (Thurmann, 1844), par suite d'une erreur (Thurmann, 1849; Bourquin, 1932).
- Myriophyllum alterniflorum
 DC. [1255] •• JU• (Int.) 146*
 Courgenay : Étang de la Creule,
 455 m, > 20 pieds (RG! 2002).
- Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker [2905]
 [NT] BE 154* Plagne: combe Vaulare, 940-970 m, > 50 pieds le 17-06-2004 (! PhD).
- *Ocimum basilicum* L. [1700] •• JU• (Sub.) 146* Fontenais : Le Banné, 470 m, < 10 pieds le 04-09-1996 (! ArB).
- Onopordum acanthium L. [2230] [EN] NE 132 Colombier: W station d'épuration, vigne abandonnée, 435 m, > 10 pieds (Ph. Küpfer et PhD! 2004), (DRUART et DUCKERTHENRIOD, 2004).
- Orobanche gracilis Sm. [1866] [VU] NE 134* Coffrane: entre Les Sagnettes et Bas de Ruz, zone humide, 750-760 m, > 20 pieds; N Bas de Ruz, 750-760 m, à plusieurs places, 37 pieds (PhD! 2004), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004); observé anciennement en NE à Fleurier par L. Lesquereux (GODET, 1853).
- Orobanche minor Sm. [1876] [NT] JU 148* Damphreux : Sous les Sapelots, 503 m, > 50 pieds le 17-07-2004 (! PhJ); Varaille, 445 m, > 200 pieds le 17-07-2004 (! PhJ). 164* Courfaivre : Les Petites Aingles, 460 m, 2 pieds le 13-07-2001 (! ArB), sur *Trifolium*

- repens Undervelier : Les Neufs Prés, 540 m, > 20 pieds le 27-06-2003 (! ArB).
- Papaver rhoeas L. s.s. var. strigosum Boenn. = ? Papaver rhoeas x dubium s.l. L •• JU (Adv.?) 148* Porrentruy: Beaupré! 1818; gare! 1923; Vendlincourt: 450 m!; Grandgourt: talus VF, 395 m! 1918 (Bourquin, 1932). L'origine et le rang taxonomique de ce taxon sont discutés.
- Polycarpon tetraphyllum (L.)
 L. [313] [CR] NE 133 (Adv.)
 Neuchâtel : rue du Château,
 450 m, > 100 pieds le 24-9-2003 (! ArB).
- *Polypodium x mantoniae* Rothm. et U. Schneid. ** NE• 132* Vaumarcus : vallon de la Vaux > château, 500 m, 2 touffes le 3-04-2004 (PhD ! 2004); inter parentes - St Aubin/Sauges : sente -> Grotte aux Filles, 432 m, > 10 frondes le 22-04-2004 (! PhD, J.-C. Vadam, J. Bovet et P. Mingard). **L BA** • Arlesheim : Schloss Birseck - Aesch: Schalberg (Вкодтвеск, 1997). Nous avons étudié, en novembre 2003, tous les témoins neuchâtelois de l'Herbier de l'Institut de Botanique de Neuchâtel concernant Polypodium sp., parfois nommés P. interjectum, dont certains, récoltés depuis plus d'un siècle, se rapportent également à ce taxon, déjà signalé par J.-C. Vadam à proximité du Jura, dans plusieurs localités du Territoire de Belfort et en Haute-Saône (VADAM, 1994). De nombreux sporanges sont avortés; le nombre de cellules de l'anneau mécanique du sporange est ± intermédiaire avec celui des parents et très variable sur une même fronde et la morphologie des frondes est ± intermédiaire (PhD).
- Potamogeton perfoliatus L. [2397] [EN] JU 142 Le Noirmont : La Goule, rive droite du Doubs, 539 m, > 10 pieds Le Noirmont : < Les Côtes, rive droite du Doubs, 508 m, > 10 pieds (PhJ et LJ! 2003). 143 Les Pommerats :

Moulin Jeannottat, rive droite du Doubs, contre la berge, 475-480 m, à plusieurs places, > 10 pieds, le 18-08-2003 (PhD! 2003) - Soubey: < Côte de Boichat près de Clairbief, rive droite du Doubs, 475 m, plusieurs st. (PhJ! 2003), (Brahier et al., 2003). Compte tenu des importantes populations de la vallée de Joux (VD) (Druart et al., 2004), le statut UICN proposé pour le Jura suisse est [VU].

- Potamogeton pusillus L. [2409] [EN] L JU • 148* Bonfol: ruisseau, herbier de l'École cantonale de Porrentruy, 07-1839; étang Chapuis le 17-07-1912 (BOURQUIN, 1932).
- Potamogeton x nitens Weber [2403] [EN] **VD** 107 Le Sentier : échoué sur la grève du lac de Joux, 1004 m, 1 pied, le 30-07-2003 (! PhD). NE 131 Bevaix: Pointedu-Grain E et W, échoué sur la grève à deux places, 428 m, 3 morceaux, le 23-10-2004 -Neuchâtel/Hauterive: échoué partout sur les grèves du lac de Neuchâtel, de la piscine du Nid-du-Crôs jusqu'au Latenium, 428 m, > 200 pieds, le 21-10-2004 (! PhD). Observé pour la dernière fois en NE au début du XX^e siècle au lac des Taillères par J. Lerch et près du Landeron par P. Morthier.
- Potentilla argentea L. [959] [EN] VD 103* Bière : place d'armes, Crêt des Fourches, 680 m, 6 pieds; Champagne, 690 m, 2 pieds; coteau de Chante-Merle, 720 m, 1 pied (PhD! 2004); p.p. introduit avec un mélange de graines pour terrains secs. **NE** 121* (Nat.) Noiraigue: gare TRN/CFF N, 729 m, > 20 pieds en fleur le 9-07-2004 (! PhD). 133 (Int.?) Hauterive: Laténium, N-W musée d'archéologie, zone inculte caillouteuse, 435 m, > 5 pieds (PhD ! 2004), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004); se trouve dans des mélanges de graines pour terrain sec.
- Primula x variabilis Goupil = Primula acaulis x veris ** NE* 134 Rochefort : les Grattes-de-Bises,

départ sentier en forêt, 890 m, 1 pied en fleur le 2-05-2004, inter parentes (! PhD). JU• 147* Boncourt : gare CFF, 370 m, 3 pieds en fleur le 16-04-2004, inter parentes (! PhD). L•• NE• 132* 133* 134* Depuis 450 m à la Tuilière de Bevaix -> 1100 m à Chaumont (Lerch, Bourquin et Favre *in* RdS 1893 et 1903; WIRTH, 1914; SPINNER, 1918; GRABER, 1923).

- Prunella x dissecta Wender = Prunella laciniata x grandiflora • VD Bière : place d'armes /Vieux Camp, 700 m, 3 pieds en fleur le 27-06-2004, inter parentes (!PhD); cor. bleue, grande, pét. laciniés, première paire de f. ± proche de l'inflor. L • JU « On trouve aux environs de Porrentruy les hybrides provenant du croisement des espèces du genre Prunella » (Bourquin, 1932).
- Prunella x intermedia Link. = Prunella x hybrida Knaf. = Prunella laciniata x vulgaris •• JU• 147* Chenevez : N intersection Fahy/Chenevez (= Le Tchâfoué PhD), le 1-07-2004 (! Léonore Lovis). L •• JU• Ajoie : sine loc. (Bourquin, 1932), cf. cidessus.
- Prunella x spuria Stapf. = Prunella grandiflora x vulgaris NE* 139* La Chaux-de-Fonds : Maison Monsieur, 615-630 m, > 5 pieds en fleur et fruit le 18-09-2001 (! PhD).
- Pseudotsuga menziesii (Mirb.)
 Franco [87] [LC] JU (Int.) 142
 Les Bois: La Petite Chaux d'Abel,
 1060 m, < 10 pieds (EC! 2000).
- Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
 [2671] [RE] VD• (Adv. Nat.) St-Cergue et Arzier: bord de route,-> col de la Givrine, > 500 pieds (F. Ciardo! 2004); espèce halophile, se répand sur les terrains imprégnés de sel lors des salages hivernaux.
- Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. = Pulmonaria col-

lina W. Sauer [1609] [NT] JU* 165* Courrendlin: La Bergerie, 620 m, < 10 pieds (EC! 2002). 166* Mettembert/Delémont: combe de Mettembert, 450-560 m (L. Scherrer! 2004, conf. PhD). **L JU** • sous *P. montana* Lej. 146* 147* 148* Porrentruy; Bressaucourt; Courtedoux, Bure, Mormont; Vasloin; Buix, etc (Bourquin, 1932). Discussion (PhD): J. Bourquin utilise la flore de Schinz et Keller (1914, 1923). Dans cette flore, P. montana Lej. = maintenant P. mollis Wulfen ex Hornem; et P. vulgaris Mérat = P. montana Lej. au sens actuel. Il en découle qu'en Ajoie, d'après J. Bourquin, c'est P. mollis qui est répandu, tandis que P. montana est très rare ou absent : P vulgaris Mérat (= P. tuberosa Schrank) à la Grotte de Réclère (Dr Butignot le 4-06-1931), (Bourquin, 1932), est déjà dans le Clos du Doubs. Enfin, dans Flora alpina (Aeschimann et al., 2004), P. mollis devient P. collina W. Sauer.

- Pulmonaria montana Lej. [1610] [NT] BE • 154* Plagnes: Les Ecovots S, 900 m, > 5 pieds; W Les Oeuches, 920 m, > 10 pieds en fleur le 17.06.2004 (! PhD).
- Ranunculus breyninus Crantz [189] [EN] L JU • Chevenez: cirque de Chexbres (= cirque de Sous les Roche sur les cartes actuelles, PhD), éboulis ombragés, 700 m! (Bourquin, 1932), sous R. geraniifolius Pourret var. oreophilus (Marsh.-Bieb.) vergens; R. breyninus Crantz, (= R. nemorosus DC.), cité plus haut comme commun en Ajoie par Bourquin (1932), n'est autre que R. tuberosus Lapeyr. (PhD).
- Ranunculus reptans L. [180] [CR] VD 107 L'Abbaye: lac de Joux, rive S-E, déjà connu de P. Villaret, toujours présent, 1 005 m, > 10 pieds le 30-07-2003 (J.-L. Moret! 1975-2003; R. Delarze, G. Kozlowski, PhD, P. Prunier et J. Bovet); également observé à proximité, par J.-L. Moret, F. Hoffer-Massard et al. en 2001 (HOFFER-MASSARD,

2002); au bord de l'extinction dans le Jura ainsi qu'en France où il n'existerait peut-être plus que deux localités actuellement, à Remoray-Boujon sur les grèves du lac de Remoray (FERREZ, PROST *et al.*, 2001) et en Isère (AESCHIMANN *et al.*, 2005). Non signalé en NE depuis 1972, pour la dernière fois à Cortaillod, sur la grève exondée du lac de Neuchâtel (PAROZ et DUCKERT-HENRIOD, 1998).

- Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai [464] [NT Nil NE (Nat.) 133* Neuchâtel: Monruz, Winthertour, rive du lac, 428 m, > 20 pieds (PhD ! 2004), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004); feuilles -> ≥ 45 cm. Un programme d'éradication des populations de Reynoutria sp. a débuté en 2004 dans la ville de Neuchâtel, organisé par Françoise Martinez au service des Parcs et Promenades, avec l'aide de Michel Horner du Service cantonal de l'Économie agricole. BE• 158* Court: Les Ravières, 670 m, > 20 pieds (EC! 2000) - Perrefitte: La Bergerie, 650 m, > 20 pieds (EC! 2000).
- Rhus typhina L. [1360] [LC] BE (Nat.) 151* Gléresse: vignes audessus du village, 440 m, < 10 pieds le 12-06-2004 (! PhJ et LJ). 157* Sorvilier: Champs du Four, 675 m, 2 pieds le 12-09-2004 (! LJ et PhJ).</p>
- Rorippa x erythrocaulis Borbas (= Rorippa amphibia x palustris) • • NE•138* Les Brenets : lac des Brenets/Chaillexon, > Bourg Dessous, plage alluviale du Doubs, 750 m, > 10 pieds en fleur et fruit le 1-08-2004 (PhD! 2001-2004); avec R. palustris et R. amphibia à proximité.
- *Rosa foetida* Herrm. [RE] **NE** 138* (Sub.?) Le Locle : la Croixdes-Côtes, haut du « sentier des Poules », 980 m, 1 buisson (G. Kurz! 2001).
- Rosa micrantha Sm. [1001] [VU] JU 147 Boncourt: VF ->

- France, 365 m, 1 buisson en fruit le 16-04-2004 (! PhD et PhJ). L JU Ajoie: dans tout le domaine (Bourquin, 1932). Était considéré comme éteint (Druart et al., (2003).
- Rosa x nitidula Besser VD 103* Bière: place d'armes, W Vieux Camp, 700 m, 2 pieds en fruit le 3-10-2004 (! PhD).
- Rubus laciniatus Willd. [1040]
 [LC] JU ◆ (Sub.) 165* Courroux:
 Les Rondez, 410 m, < 10 pieds
 (LJ! 2004).
- Rubus schleicheri Weihe L • JU• Forme des fourrés bas, particulièrement abondants et fréquents dans les placettes de régénération d'épicéas vers 1 100 m d'alt. dans les pâturages boisés des Franches Montagnes (VADAM, 2003).
- Rudbeckia laciniata L. [2087] [LC] NE• (Jar.) 252* Saint-Blaise: Loclat N, 433 m, 1 pied (PhD et C. Druart! 2004). LJU• 146* 148* (Sub.) Ajoie: parfois échappé des jardins à Porrentruy, Alle (Bourquin, 1932).
- Rumex patientia L. [484] [VU]
 NE 132 (Adv.) Vaumarcus: vallon de la Vaux S-W, 580 m, 1 pied en fleur et fruit le 16-06-2004 (! PhD).
- Rumex thyrsiflorus Fingerh. s.s. [467] [NT] NE• (Adv.) 133* Neuchâtel: gare CFF, 480 m, 2 pieds - Le Landeron: gare CFF E, ballast, 440 m, 1 pied (PhD! 1999).
- Ruscus aculeatus L. [2856] BE •
 (Sub.?) 151* Bienne: garide
 du Pavillon, 440 m, 3 pieds le
 19-02-1998 (! ArB)
- Sagina apetala Ard. subsp. erecta (Hornem.) F. Herm. [340] [VU] NE● (Adv.) 133* Neuchâtel : rue des Bercles, mur, > 50 pieds le 20-06-2003 (! N. Schoenenberger), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004). Hors dition VD 111* (Adv.) La

- Sarraz : gare CFF, 490 m, 1 touffe en fruit le 9-07-2004 (! PhD).
- Salvia verbenaca L. [1685]
 Hors dition VD Adv. Nat. 116*
 Grandson: quai entre la gare CFF
 et le lac de Neuchâtel, 440 m,
 le 4-06-1990, R. Jaccard (1995)
 – Disséminé le long de l'autoroute Genève/Lausanne (CIARDO et DELARZE, à paraître).
- Scorzonera humilis L. [2290]
 [EN] VD 112 Juriens: W Chalet-Dernier, 1270 m, > 20 pieds diss. (! 2001).
- Scrophularia vernalis L. [1748] [CR] NE 132 (Nat.) Vaumarcus: introduit par Von Buren au XIX^e siècle, pied S Château, 460 m, 3 pieds (PhD, J. Bovet, P. Mingard et J.-C. Vadam), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).
- Scutellaria altissima L. [1635] [EN] **VD•** Introduit et naturalisé par A. von Buren au XIXe siècle et observé épisodiquement depuis. 116* (Nat.) Concise: La Rochelle, pied haie de Prunus laurocerasus, 470 m, 50-100 pieds en fleur le 27-06-2004; La Raisse, de part et d'autre de la route -> La Rochelle, 460 m, 2 petites st. en fleur le 27-06-2004 (! HC). **NE** 132* (Nat.) Vaumarcus : -> La Raisse, ripisylve, au bord du lac de Neuchâtel, 430 m, > 200 pieds; S-E Château, 485 m, > 100 pieds (PhD ! 2003-2005). 133* (Sub.?) Neuchâtel: rue Matile, haut-talus, 540 m, > 5 pieds (PhD! 1999).
- Sedum anopetalum DC. [CR] VD NE 116* 132 (Nat.) Concise/Vaumarcus: introduit et naturalisé par Von Buren au XIXe siècle, et signalé encore par R. Paroz en 1984 (PAROZ et DUCKERT-HENRIOD, 1998), route de La Rochelle, talus ± rocheux, 460-470 m, à plusieurs places, > 20 pieds le 20-06-2004 (! HC).
- Sedum spurium M. Bieb. [860]
 [LC] BE* (Nat.) 143* Tramelan:
 Pâturage du Droit, 1085 m, >
 10 pieds le 18-08-2004 (! PhJ).

- L BE• 141* Villeret : signalé par Krähenbühl (1970) en 1962 et 1966 sur les rochers au nord des Neuves. 151* Orvin : près de l'église, Thiébaud *in* Krähenbühl (1970).
- Senecio inaequidens DC. [2188] [NT Ni] NE 133 (Adv.) Cornaux : gare CFF, déjà signalé par J. Bovet en 1994-1995 (puis disparu), côté N, 440 m, > 10 pieds en fleur le 18-09-2004 (! HC); plante envahissante bien installée dans la région de Genève et Lausanne au bord des VF et de l'autoroute, puis de plus en plus rare vers le N [cf. DRUART, 2003].
- Setaria faberi F. Herm. •• NE• 132* (Adv.) Vaumarcus: friche au bord de la route de Concise au S du Château, 440 m, 2 pieds en fruit le 22-10-2004 (! PhD); det. suivant Lambinon et al. (2004) d'après qui il pourait s'agir de S. marocarpa Lucznik, du moins en Belgique. Signalé également (hors dition) sur le Plateau suisse VD près de Lausanne et Villeneuve (Bornand et Hoffer-Massard, 2004).
- Silene italica (L.) Pers. •• VD• (Adv.) Vallorbe: gare CFF N-W, 810 m, sortie CVB, Ch. Bornand, F. Hoffer-Massard, C. Gremaud et al., > 5 pieds, mai 2003 (BORNAND et HOFFER-MASSARD, 2004, conf. Daniel Jeanmonod).
- Silybum marianum (L.) Gaertn. [2232] [CR] NE 132 (Adv.) Boudry: Grandchamp N et E, deux grands champs de Brassica napus, 435 m, à 3 places, > 200 pieds (J. Bovet; PhD! 2004); présent à proximité dans le jardin de J. Bovet depuis quelques années, d'où il a probablement essaimé. 138 (Int.?) La Chaux-de-Fonds: rue de la Paix 106, 1000 m, > 20 pieds (PhD! 1998-1999), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).
- Sorbus x arioïdes Michalet (= Sorbus aria x mougeotii) L • • VD • Noté sur le Mont-Tendre et la Dôle (PROST, 2000, et comm. pers).

- Symphytum grandiflorum A.DC. Hors dition GE (Adv.?) Genève: falaises St-Jean (BORNAND et HOFFER-MASSARD, 2004).
- Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. [2131] [NT] BE • (Sub.) 161* Grandval : village, 595 m, < 10 pieds (EC! 2004).
- Teucrium scordium L. s.s. [1628] [CR] **NE** 134* Coffrane : La Pôlière E, 780 m, > 100 pieds (PhD ! 2004-2005); non signalé en NE depuis J. Lerch (Spinner, 1918). Peut-être disparu du Jura vaudois : observé pour la dernière fois au lac Brenet en 1927 (Delarze, comm. pers.); la germandrée d'eau aurait été notée entre 1966 et 1982 dans la région de Bière (secteur 103 de l'Atlas). Aucune observation récente n'est venue confirmer cette localité. L'espèce fait l'objet d'un plan d'action et de suivi par R. Delarze dans le cadre de la Coordination pour la protection de la flore FR GE NE VD.
- Tragopogon dubius Scop. [2284]
 [NT] JU 164* Delémont : Dos Vie, 415 m, 5 pieds le 05-06-2003 (! ArB).
- Tragopogon pratensis L. s.s. [2282] [NT] BE 151* Bienne : Frinvillier N-W, S Chauffat, 430 m, > 10 pieds. 154* Reuchenette : Cimenterie E, haut-talus E autoroute, 590 m, > 5 pieds; Ronchâtel N-E haut-talus E autoroute, 590 m, > 5 pieds le 29-05-2003 (! PhD).
- Trapa natans L. [1256] [RE] JU (Int.) 146 Courgenay: Étang de la Creule, 455 m, > 50 pieds (EC! 2001).
- Trifolium arvense L. s.s. [1124] [VU] JU (Adv.) 142* Le Noirmont: village, 1010 m, > 5 pieds (! PhD), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).

- Bassecourt : La Pâle, 499 m, > 20 pieds (EC! 2002).
- Trifolium scabrum L. s.s. [1138] [EN] NE 132 Bôle: place d'armes de Planeyse, talus sec, 480 m, > 20 pieds en fleur le 21-06-2004 (!PhD et C. Grémaud), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).
- Trifolium suaveolens Willd. [1119]
 [LC] JU (Adv.) 165* Courroux:
 Les Colliards, 480 m, > 200 pieds
 le 15-09-2004 (! EC).
- Vaccaria parviflora Moench [396] [RE] L JU • 146* Cultures, Porrentruy: Grand'Fin (THURMANN, 1848); Le Banné! (BOURQUIN, 1932), sous Vaccaria pyramidata Med. var. typica (Beck.) Hegi – Villars, Bressaucourt (THURMANN, 1848).
- Veratrum lobelianum Bernh. [2837] [LC] NE•122* Saint-Aubin: Crêt aux Moines, 1 430 m, 2 pieds en fleur le 1-08-2004; fleur vertjaunâtre. 124* Les Bayards: Les Perroud, 1 110 m, > 100 pieds le 15-07-2003 (! PhD), à proximité de Veratrum album s.s. Les Veratrum fleurissent peu en NE et les inflorescences sont fréquemment broutées par les génisses, malgré leur toxicité, ce que nous observons régulièrement dans les massifs du Jura et de Chartreuse.
- Verbascum blattaria L. [1739]
 [EN] NE 133 (Nat.) Hauterive:
 Laténium/musée d'archéologie
 S, 430 m, 5 pieds (PhD! 2004-2005), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).
- Verbascum pulverulentum Vill.
 [1746] [CR] NE 134* (Adv.)
 Chambrelien: gare CFF, 680 m,
 2 pieds (PhD! 1999), (DRUART et DUCKERT-HENRIOD, 2004).
- Verbascum x semialbum Chaub.
 Verbascum nigrum x thapsus L
 NE• 133* Neuchâtel : au-dessous de Fontaine-André (GODET, 1853).

- Veronica cymbalaria Bodard Hors dition GE• 202* Genève: La Praille, 380 m (RÖTHLISBERGER, 2002).
- Veronica austriaca L. [1178] [VU] VD 106* Montricher: crête de Châtel, chemin, 1300 m, > 50 pieds en fleur et fruit, le 9-07-2004 (F. Ciardo! 2003; F. Ciardo et PhD! 2004; conf. PhD); en sympatrie avec V. teucrium et plusieurs individus intermédiaires. Ce taxon rare en Suisse, présent uniquement en NE, n'avait jusqu'ici été signalé en VD qu'une fois, à la Plaine de Bière (?= Prés de Bière au Mont Tendre), récolté en déc. 1907 (Herbier JBG), à confirmer.
- Veronica hederifolia L. subsp. lucorum (Klett et Richt.) Hartl [LC] VD• 116* Concise: E La Raisse, lisière ripisylve, 430 m, > 5 pieds en fleur le 3-04-2004, avec Veronica hederifolia s.s., et des plantes intermédiaires. JU • 142* Vautenaivre: Rocher du Singe S, balme, 560 m, > 10 pieds en fleur et fruit, le 16-04-2004 (!PhD). Ce taxon est présent dans des balmes et des ripisylves en milieu primaire, dans les grandes vallées et le long des principaux cours d'eau. Morphologie : les poils longs étalés doivent toujours être présents tout autour du pédoncule, mais il y a également souvent des poils courts et crépus, qui peuvent former ou non une ligne. Les hybrides avec V. hederifolia s.s. sont fréquents à la lisière des ripisylves.
- Veronica x vollmanni C. Schust.
 (= Veronica polita x persica) ●
 NE 123* Buttes: gare TRN, 770 m, > 5 pieds. 133* Neuchâtel: gare CFF, 480 m, > 5 pieds. 134* Les Geneveys-sur-Coffrane: gare CFF, 848 m, 1 pied (PhD! 1999-2001).
- Vicia sativa subsp. cordata (Wulfen ex Hoppe) Batt. [1219]
 L •• NE• (Adv.) 132* Couvet: Plancemont, 850 m, herb. Lerch in SPINNER (1918); puis plus signalé

- dans le Jura suisse à notre connaissance.
- Vulpia ciliata Dumort. s.s. [2818]
 [RE] NE 132 (Adv.) Vaumarcus: Le Moulin, jardin privé, allée graveleuse, 550 m, > 10 pieds (F. Ciardo! 2004).
- Wisteria sinensis (Sims) Sweet [1250] •• BE• (Int. Nat.) 151* La Neuveville: ville, 450 m, abondante dans cette ville (ArB! 2000).
- X Festulolium Ioliaceum (Huds.)
 P. Fourn. = Festuca pratensis s.s. x Lolium perenne **
 NE• 139* La Chaux-de-Fonds: décharge des Bulles, 1000 m,
 5 pieds (PhD! 2002). L ••
 JU• 147* 148* Courtedoux: J. Bourquin; Porrentruy, Pont d'Able, Courchavon: Thurmann (1844), in (Bourquin, 1932).

Autres taxons signalés en Ajoie par Jules Bourquin (1932) (JU), non cités dans le canton du Jura ou le Jura suisse *in* Druart *et al.* (2003)

- *Aethusa cynapium* L. subsp. *elata* Hoffm. ex Schubler et G.Martens [1454] [NT] rare
- Alcea rosea L. [LC], Sub.148*
 Porrentruy
- Alopecurus rendlei Eig [2786], Adv. 147* ou 148* Boncourt : le 28-06-1924; autrefois très commun dans le pays de Montbéliard vers 1850 d'après Contejean (1854), presque disparu en 1892.
- Amaranthus caudatus L. [445], Sub. Souvent échappé des jardins
- Anthemis austriaca Jacq., Adv. 148*
 Porrentruy: quai de l'Allaine, le 25-06-1917.
- Anthemis ruthenica M. Bieb. 147*
 Gares de Boncourt et de Delle (Doubs)
- Anthoxanthum aristatum Boiss., Adv. 148* Porrentruy: gare aux marchandises, 425 m, le 5-08.-911.
- Apium graveolens L. [1438] [LC)], Sub. çà et là subspontané
- Artemisia biennis Willdenow, Adv. Porrentruy: décombres de la Rigotterie le 1-08-1928.

- Artemisia pontica L. [2146] [RE], Sub. quelquefois échappé des jardins.
- Aster novi-belgii L. subsp. laevigatus (Lam.) Thell. [RE], Sub. plus rare qu'A. novi belgii s.s.
- Aster tradescantii L. [2040], Sub. plus rare qu'A. novi-belgii s.s.
- Atriplex hortensis L. [311], Sub. 148*
 Porrentruy: décombres du quai de l'Allaine.
- Atriplex tataricum L./Hors dition France Doubs, Adv. 147* Gares de Boncourt et de Delle, le 3-09-1912.
- Barbarea vulgaris R. Br. subsp. arcuata (Opiz) Neuman 145* 146* 148* Porrentruy: en masse; Cornol; Courchavon; Grandgourt...
- Borago officinalis L. [1613] [(VU)], Sub. souvent subspontané dans les jardins et les décombres, peu persistant.
- Brassica juncea (L.) Czern. [762] [RE], Adv. 148* Porrentruy: talus de la gare, 425 m, 1921.
- Brassica nigra (L.) Koch [758] [CR],
 Adv. 148* Porrentruy: talus de la gare; digues de l'Allaine; quai, 1909-1924; souvent en masse dans les terres remuées, mais peu persistant.
- *Briza maxima* L., Adv. Porrentruy: verger, le 6-08-1927.
- Calamagrostis canescens (Weber) Roth s.s. [2774] [EN] 148* Vendlincourt: 450 m, friche.
- Camelina sativa (L.) Crantz s.l. 148*, Adv. Mont de Cœuve, en masse dans un champ de céréales en 1912.
- *Centranthus ruber* (L.) DC. *s.s.* [2023] [NT], Sub. Boncourt.
- Cerastium tomentosum L. [383] [(LC)], Nat. tend à se naturaliser sur les murs...
- Cerinthe minor L. var. maculata (L.) = C. maculata M. Bieb. [1595], Adv. Porrentruy: décombres, 1917.
- Chrysanthemum coronarium L., Sub. parfois subspontané.
- Chrysanthemum foeniculaceum (Brouss) Stend, Sub. Boncourt : le 25-06-1921.
- Cichorium endivia L. [2260], Sub. 148* Porrentruy: route de Bellevue en 1922.
- Clematis viticella L. [CR], Sub. rarerment subspontané.
- Convolvulus tricolor L., Sub. 148* Porrentruy: aux abords de la gare, 425 m en 1926.
- Coriandrum sativum L. [1427] [RE], Adv. 148* Porrentruy: gare, le 25-06-1917.
- Cosmos bipinnatus Cav., Sub. souvent échappé de jardins.
- Cotinus coggygria Scop. [1359] [VU], Sub. parfois subspontané.

- Crataegus x macrocarpa Hegetschw.
 = Crataegus laevigata x rhipidophylla /lindmanii [VU] 146* Bressaucourt: haie, RR.
- Cucumis sativus L. [563], Sub. parfois échappé des jardins Hors dition BA, 3 st. (BRODTBECK, 1997).
- Cucurbita pepo L. [565], Sub. Porrentruy à la Rigoterie...
- Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl [613] [VU], Adv. 148* Porrentruy: gare, 425 m, le 3-08-1924.
- Eryngium planum L., Nat. 146*
 Porrentruy: Voyeboeuf, 440 m, pendant de longues années au bord de la route cantonale.
- Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. [486] [RE], Adv.
- Galium verum subsp. wirtgenii
 (F. W. Schultz) Oborny [1942] [VU] 148* Vendlincourt; entre Porrentruy et Alle, vis-à-vis du pré Ecabert, 440 m.
- Guizotia abyssinica (L.) Cass., Sub. Porrentruy : décombres près de la Rigoterie le 28-07-1931.
- Helianthus serotinus Tausch, Sub. dans le voisinage des jardins.
- Helianthus tuberosus L. [2094] [LC], Sub. Porrentruy: talus de l'av. Cuenin en 1913-1919.
- Hemerocallis flava L., Sub., très rarement subspontané.
- Heracleum sphondylium L. var. stenophyllum (Gaudin) Thell. [EN] rare. Rattaché, selon les auteurs, soit à l'espèce type, soit à la sous-espèce elegans (PhD).
- Hieracium flagelliferum Ravaud subsp. bourquinianum Zahn Porrentruy: murs des jardins de la ville, 425 m, le 17-07-1923.
- Hieracium maculatum Schrank 148* Montignez.
- Hieracium x schultesii F. Schultz = Hieracium latucella x pilosella 148* Alle, 450 m, le 8-06-1923.
- Hieracium scorzonerifolium Vill. aggr. [EN] 143* Saint-Brais: Haute Roche, 1050 m, le 10-07-1920.
- Hyssopus officinalis L. [1699] [CR], Sub. 145* Montmelon: 695 m.
- *Impatiens balsamina* L., Sub. parfois échappé des jardins.
- Lathyrus setifolius L., Adv. Porrentruy: gare, 525 m,! 20.06.1919, espèce nouvelle pour la Suisse.
- Lavatera trimestris L., Sub. Buix : décombres.
- Levisticum officinale Koch [1473], Sub. 143* 147* 148* Porrentruy; Bure; Saint-Brais.
- *Linum usitatissimum* L. [1346], Subsubspontané et disséminé dans tout le domaine.
- *Lycopersicon esculentum* Mill. [1552] [(LC)] subspontané.

- Malva verticillata L. [515], Sub. Adv. 147* Porrentruy; Courtemaîche: le 10-09-1918, sous Malva crispa L.
- Mentha x niliaca Jacq. = Mentha suaveolens x longifolia 147* 148* C Porrentruy; Alle; Réclère, etc.
- Mentha x verticillata L. = Mentha aquatica x arvensis [LC] R.
- Meum athamanticum Jacq. [1468] [VU] 145* Indiqué autrefois vers le Pichoux et aux Rangiers vers le Fer-à-Cheval (THURMANN, 1844); à Cheselles vers Bourrignon (Friche).
- Micranpelis Iobata (Michx) Greene, Sub. 148* Porrentruy: quai de l'Allaine le 10-08-1922. Cucurbitacée horticole originaire d'Am. du N.
- Nigella damascena L. [123], Sub. parfois subspontané.
- Omphalodes linifolia (L.) Moench [RE], Sub. 146* Porrentruy: jardin au pied de la Perche le 7-07-1929.
- Parthenocissus quinquefolia (L.)
 Planch. [1335] [LC], Nat. 146* 148*
 Porrentruy; Courgenay, Alle.
- Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy et E.G. Camus [1488], Adv. 145* 147* 148* Cette espèce s'est bien répandue depuis le temps où Thurmann (1848) ne citait que la localité de Microferme près Porrentruy; Courtemaîche, Alle, Sainte-Ursanne, Glovelier.
- Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [1441] [LC], Sub. s'échappe quelques fois des jardins.
- Phalaris paradoxa L. [RE], Adv. 148*
 Porrentruy: gare aux marchandises, 425 m, le 4-08-1924.
- Philadelphus coronarius L. [856] [EN], Sub. parfois subspontané.
- Platanus orientalis L. [242], Sub. parfois subspontané dans les décombres.
- Polygonum polystachyum Meisn. [450]
 [EN Ni], Sub. 147* 148*, Porrentruy:
 Cras de Cœuve, rue de Courtedoux.
- Potentilla intermedia L. [956] [EN], Adv. Porrentruy: pied des remparts de la propriété Alf. Ceppi, le 28-07-1924.
- Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. linnaeanum (Coss.) Rouy et Foucaud [RE], Adv. 148* Porrentruy: gare, les 5-08-1910 et 5-07-1925.
- Reseda odorata L. [RE], Sub.
- *Ribes aureum* Pursh, Sub. Porrentruy: 1925.
- Ribes nigrum L. [851] [LC], Sub. rarement subspontané.
- *Ribes rubrum* L. s.s. [852] [LC], Sub.
- Rorippa austriaca (Crantz) Besser [636] [CR], Nat. 147* 148* Porrentruy; Boncourt.
- Rosa x andegavensis Bastard [CR] 147*
 Bure; Courtedoux; Varandin!

- Rubus apiculatus Weihe 148* Mont de Cœuve, lisière, 540 m.
- Rubus colemanii Bloxam 148* Mont de Cœuve, lisière.
- Rubus foliosus Weihe et Nees [VU] 148* Vendlincourt : vers la sablière, 450 m, RR.
- Rubus furvus Sudre var. amplifrons (Sudre) Rob. Keller 147* Porrentruy: forêt du Fahy, 550 m.
- var. venustulus (Sudre) Rob.
 Keller 147* 148* Le Fahy;
 Vendlincourt.
- Rubus fuscus Weihe 148* Mont de Cœuve, 530 m.
- *Rubus granulatus* P. J. Müller et Lefèvre 148* Porrentruy : sentier de Lorette.
- Rubus koehleri Weihe et Nees var. spinulatus (N.B.) Rob Keller [CR] Porrentruy: la Rigoterie, 470 m.
- *Rubus melanoxylon* P. J. Müller et Wirtg. 148* Porrentruy: 1ère Combe.
- *Rubus menkei* Weihe et Nees [NT] 147* 148* Le Fahy; Chevenez; Vendlincourt!
- Rubus mercieri Genev. 148*
 Vendlincourt : vers la sablière, 450 m.
- *Rubus montanus* Lib. ex Lej. [NT] dans tout le domaine.
- Rubus neessensis Hall [NT] 148*
 Vendlincourt : vers l'étang, 450 m.
- Rubus pedemontanus Pinkw. [1035] [NT] Appartient à la flore de notre domaine, l'hybride R. capitulatus = R. Bellardii x R. caesius ayant été observé à Outremont sur Saint-Ursanne. Sous R. bellardii Weihe. À rechercher et confirmer.
- Rubus rivularis P. J. Müller et Wirtg. var. angustisetus (Sudre) Schmidely. 147* 148* Le Fahy; sentier de Lorette à la 1ère Combe; Mont Cœuve, 540 m.
- Rubus rudis Weihe et Nees [VU] 147*
 Forêt du Fahy, 550 m
- *Rubus scaber* Weihe et Nees [1036] 148* Vendlincourt : vers la sablière, 450 m.
- Rubus serpens Weihe 147* 148* répandu et souvent extrêmement commun dans les forêts.
- Rubus tereticaulis P.J. Müller subsp. bourquinii Rob Keller Mongremay, Ordons le 11-08-1920.
- Rubus timbal-lagravei W. et N. 148*
 Mont de Cœuve, 540 m.
- Rubus vestitus Weihe et Nees [1036]
 [LC] très commun dans tout le domaine.
- Rumex salicifolius Weinm., Adv. 148*
 Porrentruy: décombres du quai de l'Allaine, le 20-07-1923; espèce nordaméricaine.
- *Sagina apetala* Ard. *s.s.* [339] [EN] avec *S. procumbens,* mais plus rare.

- Satureja hortensis L. [1687], Sub. souvent subspontané.
- Sedum villosum L. s.s. [872] 148* Indiqué autrefois à Bonfol, Vendlincourt et Courtavon (Thurmann, 1848), d'où il semble avoir disparu.
- *Silene coronaria* (L.) Clairv. [434] [VU], Sub. 146* Porrentruy: l'Oiselier, 453 m.
- Spinacia oleracea L. [289] (Sub.)
- Syringa vulgaris L. [1733] [NT], Sub. Nat. 146* 147* parfois subspontané; paraît naturalisé à Porrentruy vers les abattoirs et route de Courgenay.
- Tanacetum balsamita L., Sub. quelquefois subspontané.
- *Tolpis staticifolia* (All.) Sch.Bip. = *Hieracium staticifolium* All. [2343] [RE] 148* (Adv.). Gares de Porrentruy, le 23-06-1921 et de Delle, le 17-07-1923.
- *Torilis arvensis* (Huds.) Link *s.s.* [1422] [VU], Adv. Très rare et fugace 148* Porrentruy: gare, le 8-08-1925.
- *Tradescantia virginiana* L. [RE], Sub. occasionnelle.
- Triticum durum Desf. [RE], Adv.lieux incultes.
- *Triticum turgidum* L., Sub.
- Tropaeolum majus L., Sub.
- Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert [396] [CR], Adv. 146* 147* 148* Décombres, jardins Porrentruy: gare, bas de la Perche, Rigoterie, etc.
- Verbascum chaixii Vill. [1737], Adv. 148* Porrentruy: quai de l'Allaine, 1 pied le 7-07-1917.
- Veronica triphyllos L. [1804] [CR] Porrentuy: La Perche, champs, Lapaire et Thurmann en 1841.
- Viola x wittrockiana Gams = Viola hortensis (DC.) Wettestein, Sub. échappé des jardins.
- *Xeranthemum annuum* L., Sub. Porrentruy: décombres.

Bibliographie

- Aeschimann D. et Burdet H.M., 1994. Flore de la Suisse – Le nouveau Binz. Neuchâtel, Éd. du Griffon, 603 p. CH F
- AESCHIMANN D. et HEITZ C., 1996. Index synonymique de la Flore de Suisse et territoires limitrophes (ISFS). Genève, CRSF, Centre du réseau Suisse de Floristique, Documenta Floristicae Helvetiae 1, 318 p. CH
- Aeschiman D., Lauber K., Moser D.M. et Theurillat J.-P., 2004. *Flora alpina*. Paris, Belin, 3 vol.

- Bornand Ch. et Hoffer-Massard F., 2004. Espèces nouvelles dans le sudouest de la Suisse. *Bull. Cercle Vaud. Bot.* 33: 99-122. **VD**
- Bourquin J., 1932. Flore de Porrentruy. Porrentruy. Actes de la Société jurassienne d'Émulation 37 : 29-208. Rééd. 1933. Delémont, 186 p. **JU F**
- Brahier A., Juillerat Ph., Monnerat Ch., 2003. Notes botaniques jurassiennes. *Actes de la Société jurassienne d'Émulation*, 2003: 97-122. **JU BE**
- Brodtbeck T., Zemp M., Frei M., Kienzle U. et Knecht D., 1997-1999. Flora von Basel und Umgebung 1980-1996. Basel, Mittelungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel, 2 teil, 1003 p. **BA SO F**
- CEPPI H. et HOFFER-MASSARD F., 2000. Les gorges de l'Areuse - Excursion du 29 mai 1999. *Bull. Cercle Vaud. Bot.* 29 : 11-18. **NE**
- CHAILLET J.-F. de, 1836. Catalogue des plantes observées dans le canton de Neuchâtel par M. le capitaine Chaillet. (Copie de la main de Ch.-H. Godet à partir d'une copie de Louis Coulon fils). Manuscrit déposé à la Bibliothèque de l'institut de botanique de l'Université de Neuchâtel. **NE**
- CHRIST H., 1883. *La flore de la Suisse et ses origines*. Trad. E. Tièche. Bale-Genève-Lyon, Georg éd., 576 p. **CH**
- CIARDO F. et DELARZE D., à paraître. Observations floristiques sur l'autoroute lémanique : espèces nouvelles, halophiles et rares. Saussurea. **GE VD**
- Contejean M. Ch., 1854. Enumération des plantes vasculaires des environs de Montbéliard. Besançon, Imprimerie d'Outhenin-Chalandre fils, 247 p. F JU NE SO BA
- DRUART PH. et DUCKERT-HENRIOD M.-M., 1999. Notes de floristique neuchâteloise I. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 122 : 65-83; V, 2003, 126 : 49-67; VI, 2004, 127 : 27-56; VII, 2005, 128 : 83-96, à paraître. **NE BE JU VD**
- Druart Ph., 2003. Notes de floristique vaudoises I. *Bull. Cercle vaud. Bot.* 32 : 115-123 ; 2004, II, 33 : 123-128. **VD**
- DRUART PH., BOLLIGER M., BRAHIER A.,
 BRODTBECK TH., BURGER G., CEPPI H.,
 DUCKERT-HENRIOD M.-M., GROSSENBACHER E.,
 JUILLERAT PH., KEEL A., LATOUR C.,
 MONNERAT CH., MULLER-WIRZ E., VITTOZ P.,
 2003. Liste des plantes vasculaires du
 Jura suisse présentées par canton Mise

- à jour 2002. S.B.F.C., Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne 1 : 140-175. **CH**
- DRUART PH., JUILLERAT PH., BRAHIER A., CEPPI H.,
 DUCKERT-HENRIOD M.-M. et JUILLERAT L.
 éds., 2004. Plantes vasculaires du
 Jura suisse par canton Révision 2003.
 S.B.F.C., Les Nouvelles Archives de la
 Flore jurassienne 2 : 143-158. VD NE
 BE JU
- ERHARDT W., GÖTZ E., BÖDEKER N. et SEYBOLD S., 2000. Zander - Dictionnaire des noms de plantes. Eugen Ulmer OmbH et Co., 16° éd. Stuttgart, 990 p.
- Ferrez Y., Prost J.-F., André M., Carteron M., Millet P., Piguet A. et Vadam J.-C., 2001. Atlas des plantes rares et protégées de Franche-Comté. Naturalia Publications / Société d'Horticulture du Doubs et des Amis du Jardin Botanique, Besançon, 310 p. **F**
- Godet Ch.-H., 1853. Flore du Jura ou description des végétaux vasculaires qui croissent spontanément dans le Jura suisse et français plus spécialement dans le Jura neuchâtelois. Neuchâtel, 872 p. **NE CH F**
- Godet Ch.-H., 1869. Flore du Jura. Supplément. **CH F**
- GONSETH Y., WOHLGEMUTH T., SANSONNENS B. et BUTTLER A., 2001. Die biogeographischen Regionen der Schweiz / Les régions biogéographiques de la Suisse. Berne, BUWAL / OFEFP, Documents environnement n° 137. **CH**
- Graber A., 1923. La Flore des gorges de l'Areuse et du Creux-du-Van. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 48 : 25-365. **NE**
- GUINOCHET M. et VILMORIN R. de, 1973-1984. Flore de France. Paris, Éd. du CNRS, 5 vol., 1879 p. **F**
- Hoffer-Massard F., 2002. Lieux humides du Jura vaudois, Marchairuz, vallée de Joux - 21 juillet 2001. *Bull. Cercle Vaud. Bot.* 31: 27-30. **VD**
- JACCARD R., 1995. Notes floristiques. *Bull. Cercle vaud. Bot.* : 24 : 109-112. **VD**
- Jauzein Ph., 1995. Flore des champs cultivés. INRA / SEPRA, 898 p. **F**
- JOVET P. et VILMORIN R. DE; KERGUELEN M., 1972-1990. Flore descriptive et illustrée de la France par l'Abbé H. Coste -Suppléments. Paris, Éd. Librairie scientifique et technique A. Blanchard, 7 vols., 875 p. **F**
- Kerguélen M. et Bock B., 2001. *Index* synonymique: version informatique.

- Krähenbühl Ch., 1970. Répertoire des plantes vasculaires du Jura bernois. Delémont. Association pour la Défense des Intérêts du Jura et sa Commission pour la protection de la nature, 205 р. JU BE
- Lambinon A J., Delvosalle L. et Duvigneaud J., 2004. Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (Ptérydophytes et Spermatophytes). Meise, Éd. du Jardin botanique national de Belgique, 5° éd., 1167 p.
- Lauber K. et Wagner G., 2000. Flora Helvetica - Flore illustrée de la Suisse. Haupt, Berne, 1616 p. **CH**
- MINGARD P., 2004. Notes floristiques 2003. Bull. Cercle vaud. Bot.: 33: 133-140. VD
- Monerat Ch., 1999.Contribution à la flore du Jura. Porrentruy. Actes de la Société jurassienne d'Émulation, 65-74. **BE JU**
- MÜLLER G., 1993. Avis de recherche À propos des espèces non retrouvées dans le canton lors du dernier recensement de la flore. *Bull. Cercle vaud. Bot.*: 22: 133-136. **VD**
- Paroz R. et Duckert-Henriod M.-M., 1998. Catalogue de la flore du canton de Neuchâtel. Neuchâtel, Éd. du Club Jurassien, 560 p. **NE VD BE**
- Pottier-Alapetite, G., 1943. Recherches phytosociologiques et historiques sur la végétation du Jura central et sur les origines de la flore jurassienne. Station Internationale de Géobotanique méditerranéenne et Alpine de

- Montpellier. Tunis, Thèse de doctorat, 339 p. **F CH**
- Prost J.-F., 2000. Catalogue des plantes vasculaires de la chaîne jurassienne. Société linnéenne de Lyon, 428 p. F CH
- RdS: Le Rameau de Sapin, 1866 -> -Neuchâtel, revue du Club Jurassien. **NE**
- RÖTHLISBERGE J., 2002. Un *Eragrostis* nouveau pour la Suisse et autres découvertes intéressantes en Suisse romande. *Saussurea* 32 : 123-128.
- Schinz H. et Keller R., 1914, 1924. Flora der Schweiz. Teil I Excursionsflora Teil II Kritischeflora. Zürich, 3. u. 4. Au Éd. Française: WILCZEK E. ET SCHINZ H., 1909. Flore de la Suisse. Lausanne, Rouge et cie Éd., 690 p. **CH**
- SPINNER H., 1918. La distribution verticale et horizontale des végétaux vasculaires dans le Jura neuchâtelois. Neuchâtel, Attinger. **NE**
- Thurmann J., 1844. Énumération des plantes vasculaires du district de Porrentruy. Porrentruy, Archives de la Soc. jur. d'Émulation. **JU F**
- Thurmann J., 1849. Essai de phytostatique appliqué à la chaîne du Jura et aux contrées voisines. Berne, Jent & Gassmann, 2 vols. CH F
- THIÉBAUD M., 1953. Notes floristiques sur la région biennoise. Neuchâtel. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. Nat.* 76 : 45-58. **BE**
- VADAM J.-C., 1990. *Equisetum x moorei* Newm. et *Dryopteris remota* (A. sBraun ex Döll) Druce, deux ptéridophytes rares

- et méconnues du Jura septentrional. Montbéliard, *Bull. Soc. d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard* 1990 : 99-103. **F JU**
- VADAM J.-C., 1994. Notes floristiques. Montbéliard, *Bull. Soc. d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard* 1994 : 110. **F**
- VADAM J.-C., 2003. Notes floristiques. Montbéliard, *Bull. Soc. d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard* 2003 : 224-230. **JU F**
- Welten M. et Sutter R., 1982. Atlas de distribution des Ptéridophytes et des Phanérogames de la Suisse Bâle, Birkhäuser. 2 vol., 716 + 698 p. CH Ain
- WIRTH C., 1914. Flora des Traverstales und Chasseronkete. *Dresden N, Beitr.* z. Bot. Zentralblatt

Remerciements

Nous remercions Philippe Juillerat pour la rédaction de notules et la relecture critique du manuscrit, Max André, Yorick Ferrez pour la relecture, Gilles Bailly pour la mise en page, Jürg Röthlisberger pour les traductions en allemand, et tous les contributeurs qui ont bien voulu nous communiquer leurs notes, spécialement Arnaud Brahier, Henri Ceppi, Étienne Chavanne, Franco Ciardo, Françoise Hoffer-Massard et Laurent et Philippe Juillerat.